



INFORMATION

2017-8 No. 404

堀井薬品工業株式会社
本社 〒540-0038大阪府中央区内淡路町1-2-6
TEL (06) 6942-3481 (代表)
FAX (06) 6943-0650
http://www.hori-pharm.co.jp

潰瘍性大腸炎治療剤

メサラジン腸溶錠400mg「KN」

用法・用量の追加及び添付文書改訂のお知らせ

謹啓 平素は弊社製品につき格別のお引立てを賜り有難く厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社販売の潰瘍性大腸炎治療剤メサラジン腸溶錠400mg「KN」につきまして、平成29年8月2日付で製造販売元の小林化工株式会社が製造販売承認事項一部変更承認を取得し、用法・用量が追加となりました。

先発医薬品（アサコール錠400mg）と同様に、寛解期に1日1回投与が可能となり「服薬アドヒアランス」の向上が期待できます。

また、用法・用量の追加に伴い、「添付文書」を改訂致しましたので、併せてご案内申し上げます。

つきましては、今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■ 改訂品目

統一商品コード	品名	包装	元梱	JANコード	GS1コード (販売包装単位)
603721	メサラジン腸溶錠 400mg「KN」	100錠 (PTP)	30	4987320603721	14987320603728
603738		500錠 (PTP)	12	4987320603738	14987320603735

※統一商品コード、価格等の変更はございません。

■ 一部変更承認年月日 平成29年8月2日

■ 改訂内容

改訂前	改訂後
<p>【用法・用量】</p> <p>通常、成人にはメサラジンとして1日2,400mgを3回に分けて食後経口投与するが、活動期には1日3,600mgを3回に分けて食後経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。</p>	<p>【用法・用量】</p> <p>通常、成人にはメサラジンとして1日2,400mgを3回に分けて食後経口投与するが、<u>寛解期には、必要に応じて1日1回2,400mg食後経口投与とすることができる。</u>活動期には、1日3,600mgを3回に分けて食後経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。</p>

■ 新添付文書封入製品出荷予定

平成29年9月下旬 ※出荷日は地域により多少異なりますのでご了承願います。